

ICS

CCS 点击此处添加 CCS 号

T/GDSBME

广东省生物医学工程学会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

艾草相关产业系列标准 艾草油（脂）（超临界-分子蒸馏法）

Argy Wormwood Industry
Artemisia argyi Oil (Lipid) (supercritical fluid-molecular distillation extraction)

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2022 年 07 月 07 日）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

广东省生物医学工程学会 发 布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

T/GDSBME 《艾草相关产业系列标准》日前计划发布如下部分：

- 第1部分：艾草提取物 总则
- 第2部分：艾草浸膏（超临界法）
- 第3部分：艾草原液（超临界法）
- 第4部分：艾草精油（超临界-分子蒸馏法）
- 第5部分：艾草油（脂）（超临界-分子蒸馏法）

.....

本文件是T/GDSBME 的第5部分。

本文件由暨南大学提出。

本文件由广东省生物医学工程学会归口。

本文件起草单位：暨南大学、广州暨南生物医药研究开发基地有限公司、广州少伯健康科技有限公司、广东工业大学、广东药科大学、南阳少伯药业有限公司、南阳华康艾制品有限公司、国家中药现代化工程技术研究中心、中国科学院华南植物园。

本文件主要起草人：王一飞、郭玉英、任哲、王巧利、曹晖、崔登科、郑俊霞、王治平、马婧、李延庆、孙平华、张炜、刘涛。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有文体和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：广东省广州市天河区黄埔大道西暨南大学生命科学技术学院5楼南区生物医药基地，联系电话：020-85222072。

文件起草单位通讯地址：广东省广州市天河区黄埔大道西601号暨南大学，联系电话：020-85220504。

引 言

艾草在我国分布广泛，药用历史悠久。传统药性理论认为其具有温经止血、散寒止痛，外用有祛湿止痒等功效。近年来随着艾草现代药理活性研究的逐渐深入、现代化的提取分离技术日趋完善，艾草资源的开发及综合应用也逐步走向精细化。为了促进艾草现代化工业技术的应用，全面提升艾草精细加工生产技术水平，实现艾草产业的资源节约、生态环保、提质增效与可持续发展。根据艾草现代提取工艺特点、不同艾草提取物的性能以及不同提取物的应用与开发基本要求，针对艾草提取产业工业化需求，确保标准制定的系统性和应用的便利性，制定了艾草提取物的系列标准。T/GDSBME 本次发布了五个部分。

——第1部分：艾草提取物总则 目的在于确立艾草提取物的总体要求。

——第2部分：艾草浸膏（超临界法） 目的在于确立超临界二氧化碳萃取工艺所得水不溶性组分艾草浸膏的技术要求。

——第3部分：艾草原液（超临界法） 目的在于确立超临界二氧化碳萃取工艺所得水溶性组分艾草原液的技术要求。

——第4部分：艾草精油（超临界-分子蒸馏法） 目的在于确立超临界二氧化碳萃取工艺联用分子蒸馏工艺所得可挥发性艾草精油的技术要求。

——第5部分：艾草油（脂）（超临界-分子蒸馏法） 目的在于确立超临界二氧化碳萃取工艺联用分子蒸馏工艺所得常温半固体状艾草油（脂）的技术要求。

本系列标准还将陆续发布艾草蜡质等艾草提取物部分。

艾草相关产业系列标准
艾草油（脂）（超临界-分子蒸馏法）

1 范围

本标准规定了艾草油（脂）的定义、要求、检验规则、试验方法。
本标准适用于对艾草油（脂）的质量进行分析评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 14454.2 香料 香气评定法
- GB/T 14455.5 香料 酸值或含酸量的测定
- GB/T 14454.5 香料 酯值或含酯量的测定
- 化妆品安全技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

艾草油（脂）（超临界-分子蒸馏法）*Artemisia argyi* Oil（Lipid）（supercritical fluid-molecular distillation extraction）

经二氧化碳超临界萃取从菊科植物艾（*Artemisia argyi*）地上部分提取超临界浸膏后，通过分子蒸馏法从艾草浸膏中分离的常温半固体状油（脂）。

4 要求

- 4.1 色状：淡黄色至黄棕色半固体。
- 4.2 杂质：无肉眼可见杂质。
- 4.3 香气：具有艾草特有香气。
- 4.4 酸值（以 KOH 计）/(mg/g)：≤95.0
- 4.5 酯值：80~150
- 4.6 典型图谱分析：

代表性组分见表3，各代表性组分含量范围及气相色谱-质谱法总离子流图参见附录A

表1 代表性组分

代表性组分名称	CAS号	含量
十氢二甲基甲乙烯基萘酚 Neointermedeol	5945-72-2	>10%

5 试验方法

5.1 色状、杂质的检定

将试验置于比色管内，在白色背景下观察其色泽及杂质。

5.2 香气评定

按 GB/T 14454.2 的规定。

5.3 酸值的测定

按GB/T 14455.5 的规定。

5.4 酯值的测定

按GB/T 14455.6 的规定。

5.5 典型图谱的测定

5.5.1 仪器

- a) 气相色谱-质谱联用仪;
- b) 柱: (5%-苯基)-甲基聚硅氧烷色谱柱 (柱长为 30m, 柱内径为 0.25mm, 膜厚度为 0.25 μ m);
- c) 检测器: MS 检测器;

5.5.2 操作步骤

5.5.2.1 样品溶液: 精密称取艾草油 (脂) 1g, 置于 20mL 量瓶中, 甲醇稀释, 超声 10min 溶解, 定容至刻度, 静置与 4℃冰箱内保存 30min, 微孔滤膜过滤即得。

5.5.3 测定

5.5.3.1 色谱、质谱条件:


- d) 气相色谱参数:
 - 色谱柱: HP-5MS 石英毛细管柱, (30m \times 0.25mm \times 0.25 μ m), 或相当者;
 - 载气: 氦气, 纯度 \geq 99.999%;
 - 流速: 1mL/min
 - 进样口温度: 240℃
 - 分流比: 20:1
 - 升温程序: 初始 70℃保持 2min, 以 5℃/min 的速率升至 150℃保持 2min, 以 3℃/min 的速率升至 260℃保持 2min, 以 10℃/min 升至 290℃。
- e) 质谱参数:
 - 电离方式: 电子轰击电离 (EI)
 - 电离能量: 70eV
 - 扫描方式: 全扫描
 - 扫描范围: 30-500 m/z

5.5.3.2 数据处理

计算各流出组分面积占总流出组分面积百分比。

附 录 A
(资料性)
总离子流图

艾草油（脂）溶液顶空-气相色谱-质谱法总离子流图见图A. 1。



图A. 1 艾草油（脂）总离子流图

艾草油（脂）代表性组分保留时间见表A. 1。

表 A. 1 艾草油（脂）代表性组分

保留时间	代表性组分名称	CAS号	占总流出成分面积百分比
24.04	十氢二甲基甲乙烯基萘酚 Neointermedeol	5945-72-2	>10%